

つるなしスジなし
丸莢インゲン

ゲリルインゲン



(莢色の比較)



「早生」、「濃緑」、「耐倒伏性」

- 1、倒伏しにくく莢に土がつきにくい
- 2、莢の曲がりが少ない
- 3、莢も葉も濃緑
- 4、60日で一斉収穫
- 5、莢の揃いが良い
- 6、取り遅れても莢の凹凸が目立ちにくい

(作型)

暖地基準	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
ハウス	■								●	■		
トンネル	●	●		■								
露地			●	●	■			●	●	■		

● : 播種 — : 生育 ■ : 収穫



宝種苗株式会社
福岡市博多区板付6-7-8
TEL092-501-0025

ビクトリーインゲン

〈スジなし・大莢・食味最高〉



(特性)

1. つる有り、スジなしの大平莢インゲン。
2. 熟期は、早生で播種後60日前後より収穫ができる。
3. 莢は幅2cm、長さ20cm前後で色は鮮緑色で曲がりは少ない。
4. 肉質は柔らかく、風味があり食味が大変良い。
又、収穫が遅れても莢が硬くなりやすく収穫幅が広い。

(栽培表)

栽培地/月	栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一般地 暖地	ハウス抑制							●		■	■	
暖地 一般地	ハウス促成	●			■							
暖地 一般地 冷涼地	雨除け		●		■							

● : 播種

■ : 収穫

 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL092-501-0025

FAX092-573-3043

URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

Email info@takara-seed.co.jp

早生まるみ豌豆

〈早生で揃い良く、多収量、美味しい実豌豆〉



（特性）

1. 寒さに強く、分枝が多く草勢が旺盛で収量が大変多い。
2. 開花の早い白花の実豌豆で、収穫が早くから出来ます。
3. 莢の実入りが多く、大粒で甘く食味が良い。

（栽培表）

	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
暖地	●							■	■	
		●							■	

● : 播種

■ : 収穫



宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL 092-501-0025 ・ FAX 092-573-3043

Email info@takara-seed.co.jp ・ URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

サラダそらまめ ハニー

〈おつまみ・サラダに最高の生食兼用ソラマメ！〉



(特性)

1. 生食可能で、甘味と青臭みを楽しむ。
2. 大長莢で豆も大きく、耐寒性に強い。
3. 莢の長さは25cm前後、豆の色は白緑色。
4. 草丈90cm程度で作りやすい。

※注意点


生食利用の場合は収穫適期を守り、若さやを収穫してください。
取り遅れると、食味が劣ります。

(栽培表)

作型/月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
暖地	●	●					■	■		
中間地	●	●						■	■	

● : 播種 ■ : 収穫

サラダに！
おつまみに！！



※とり遅れても、通常のソラマメとして利用できます。



宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL 092-501-0025 ・ FAX 092-573-3043

Email info@takara-seed.co.jp ・ URL <http://www.Takara-seed.co.jp>