

F1 ミニサウ白菜

〈耐暑性の強いミニ白菜〉



(特性)

1. 播種後40日～45日前後で700g～1kgになるミニ白菜。
2. 外葉がコンパクトで密植栽培ができる。
3. 耐暑性、耐病性に優れ、作りやすい。
4. 歯切れがよく、食味良い。
サラダ、炒め物、漬物に適する。
5. 植え付けは株間20cm、畦間25cmで10a当たり10,000本前後にする。
6. 直蒔き シーダークーパの場合 20cm2粒

(栽培表)

作型/月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ハウス トンネル 雨除け		●	■	●	■	●	■		
露地				●	■	■	■	■	■

● : 播種 — : 生育 ■ : 収穫



宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL 092-501-0025 ・ FAX 092-573-3043

Email info@takara-seed.co.jp ・ URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

F1

CR宝月65白菜

根こぶ病抵抗性。播種後65日で2.5kg前後の早生種



- 平暖地の10～12月どりに適する。生育日数は適期蒔で65日前後。
- 黄芯系で結球の形の良い早生種。
- 根こぶ病抵抗性で、石灰欠乏症・ゴマ症に強く栽培が容易。
- 芯は短く、胴張り・尻張りの良い砲弾葉重型品種。
- 適期蒔65日で2.5kg、日を置けば3kg以上に肥大する。

作型／月	6	7	8	9	10	11	12	1
平暖地			●	●	■		■	
寒高冷地	●	●	■	■	■			
中間地			●	●	■	■		



宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL 092-501-0025 ・ FAX 092-573-3043

Email info@takara-seed.co.jp ・ URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

宝交配

CR宝月75白菜


根コブ病に強い、黄芯系白菜



(特性)

1. 暖地の11月～1月どりに適する。適期蒔きで75日前後。
2. 根コブ病抵抗性で石灰欠乏症、ゴマ症に強く栽培が容易。
3. 胴張り、尻張りの良い円筒形で球頭は軽く包被する。
適期蒔き75日で3kg～3.5kg位になる豊産種。
4. 濃緑の黄芯系で、完全結球しても黄色がさめにく尻張りがよい。

(栽培表)



 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL092-501-0025

FAX092-573-3043

URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

o.jp Email info@takara-seed.co.jp

CR秋月85

白菜



(特性)

1. 熟期は播種後85日前後で3kgぐらいになる。
2. 根コブ病に強く生理障害の発生も少ない。1月～3月穫り品種。
3. 球姿は尻張り、胴張りの良い同筒型で外葉も濃緑で少し立性です。
4. 球内色は黄芯で見栄えも良くカット販売や加工用にも最適です。

(栽培表)

栽培型／月	7	8	9	10	11	12	1	2	3
中間地		●			■				
		●				■	■		
暖地		●				■			
		●					■	■	

● : 播種

■ : 収穫

 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL092-501-0025

FAX092-573-3043

URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

o.j.p Email info@takara-seed.co.jp